


Coronavirus COVID-19


ARBRES DÉCISIONNELS (D,H,A,T,DD,P)

Dans le contexte de la présence de la COVID-19 au Québec, le MSSS informe les professionnels dentaires à travers l'arbre décisionnel ci-dessous des procédures à suivre concernant les interventions à prodiguer en clinique dentaire. Ces mesures sont préconisées uniquement de façon temporaire et immédiate.

Arbre 1 (patients asymptomatiques) :



Arbre 2 (patients suspectés/confirmés) :





Ne pas diffuser

Coronavirus COVID-19

ANNEXE 7 : NIVEAUX D'INTERVENTION POUR RALENTIR LA TRANSMISSION DE LA COVID-19 : ADAPTATION DE LA PRATIQUE DENTAIRE

Résumé des adaptations de la pratique dentaire en fonction du niveau d'intervention pour ralentir la transmission de la COVID-19 (voir feuillets 4, 5, 6 et 6A)

Statut du patient	Asymptomatique		
Niveaux d'intervention	 Niveau d'intervention 1 (précautions universelles)	 Niveaux d'intervention 2, 3 et 4	
	Tous les types d'interventions	Intervention sans production d'aérosols ou à faible production d'aérosols provenant de liquides biologiques (précautions universelles)	Intervention à risque de production d'aérosols provenant de liquides biologiques (précautions aériennes-contact)
Masque	Porter le masque de procédure (ou chirurgical) : <ul style="list-style-type: none"> • Minimum de niveau 2 si interventions sans aérosols provenant de liquides biologiques ou à faible production d'aérosols provenant de liquides biologiques; • Niveau 3 si interventions à risque de production d'aérosols provenant de liquides biologiques. 	Porter le masque de procédure (ou chirurgical) minimum niveau 2.	Masque N95 certifié avec test d'étanchéité ou alternative acceptable selon Santé Canada.
Protection oculaire	Lunettes de protection avec protections latérales ou visière. Note : les verres correcteurs ne sont pas des lunettes de protection.		Visière
Uniforme	Porter l'uniforme de travail.	Porter l'uniforme de travail. Prophylaxie dentaire : en raison des nombreuses gouttelettes liées à cette intervention : port de la blouse à manches longues (une par patient) et visière.	Porter une blouse à manches longues, jetable ou lavable, non stérile (une par patient). Les gants doivent recouvrir les poignets de la blouse.
Gants	Porter des gants non stériles, à usage unique, bien ajustés et devant recouvrir les poignets;		
Ventilation/filtration et salles	-Traiter dans une salle ouverte ou fermée. -Viser un taux d'élimination de 90 % d'efficacité suivant le temps d'attente avant d'entrer dans la pièce sans l'EPI requis si intervention à risque de production d'aérosols provenant de liquides biologiques.	-Traiter dans une salle ouverte ou fermée.	-Traiter dans une salle fermée. -Viser un taux d'élimination de 99 % d'efficacité suivant le temps d'attente avant d'entrer dans la pièce sans l'EPI requis.
Entretien des lignes d'eau et suctions après chaque intervention	Faire boire les suctions lentes et rapides par intermittence (de façon à créer un tourbillon) en utilisant 100 ml d'eau tiède après chaque intervention.	Faire boire les suctions lentes et rapides par intermittence (de façon à créer un tourbillon) en utilisant 100 ml de solution nettoyante ou désinfectante appropriée après chaque intervention.	
Décontamination et stérilisation des instruments	Étape de prétrempage n'est pas nécessaire.	Prétrempier les instruments dans une solution désinfectante.	